

JAK SUPLEMENTOWAĆ SIARĘ CCT100 PO DNIU 1. (PIERWSZYM).



1

Aby obliczyć potrzebną ilość gramów siary w proszku, określ poziom wyzwań zdrowotnych, przed którymi stoją Twoje cielęta. Poziom wyzwań zdrowotnych powinien być ustalany na podstawie wskaźników zachorowań i zgonów. Jeśli masz pytania porozmawiaj ze swoim doradcą Alta.

Poziom zdrowia cieląt	Gramy proszku Siary CCT100, które należy dodawać codziennie		
	1 odpój	2 odpoje	3 odpoje
Niski (słaby)	70g	35g	23g
Średni	105g	53g	35g
Wysoki	140g	70g	47g

2

Zdecyduj, ile dni będzie trwał program CCT100 PO DNIU 1. (pierwszym).

- ▲ Karm 3-14 dni dla maksymalnej ochrony.
- ▲ Jeśli karmienie trwa krócej, podawaj większą dawkę.
- ▲ Dłuższe karmienie jest generalnie korzystniejsze, ponieważ pomaga wspierać cielęta w czasie walki z biegunką.
- ▲ Cielęta, które nie otrzymują odpowiedniej siary i nie nabyły odporności biernej, również odnoszą z tego korzyść.

3

Dodaj żadaną ilość siary w proszku do mleka pełnego lub preparatu mlekozastępczego - wymieszaj, aby uzyskać mleko przejściowe.

- ▲ Mleko pełnotłuste - dodaj proszek bezpośrednio do mleka.
- ▲ Preparat mlekozastępczy – zastąp te same gramy preparatu mlekozastępczego takimi samymi gramami siary w proszku, aby uniknąć podawania zbyt wielu pokarmów stałych na raz.
- ▲ Mieszać w temperaturze 43-49°C.

4

Kontynuuj monitorowanie i rejestrowanie wskaźników zachorowań i śmiertelności, aby upewnić się, że podawany poziom CCT jest wystarczający dla cieląt.